

SINAIS DE ALERTA NA DENGUE

- Dor abdominal intensa e contínua
- Vômitos persistentes
- Hipotensão postural
- Hipotensão arterial
- Pressão diferencial < 20 mmHg (PA convergente)
- Hepatomegalia dolorosa
- Hemorragias importantes
- Extremidades frias, cianose
- Pulso rápido e fino
- Agitação e/ou letargia
- Diminuição da diurese
- Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia
- Dispnéia (Falta de ar)
- Aumento repentino do hematócrito
- Taquicardia e lipotímia

OBSERVAÇÕES:

- Em vigência de hemorragia visceral importante, sobretudo no sistema nervoso central, associado à plaquetopenia <50 mil/mm³, avaliar a indicação de transfusão de plaquetas.
- As manifestações não usuais (encefalite, hepatite, miocardite, entre outros) podem ocorrer em qualquer estágio da doença e terão abordagens específicas.

INDICAÇÃO DE TRANSFUÇÃO DE PLAQUETAS:

- plaquetas menores ou iguais a 10.000.
- plaquetas menores ou iguais a 20.000 com febre.
- plaquetas menores que 50.000 com evidência de sangramento grave (hemorragia digestiva, DPP, sangramento transvaginal) ou gestante com indicação cirúrgica.
- cálculo da quantidade a ser transfundida: uma unidade de plaquetas para cada 7 Kg, podendo ser repetido a cada 8 a 12 hs.

Dia 1

ATENÇÃO NO 1º ATENDIMENTO DE GESTANTE COM SUSPEITA DE DENGUE

Na história clínica, valorizar queixas e evolução da febre, quadro alérgico, exantema, sangramento espontâneo ou provocado, e sinais de alerta. Avaliar doenças pré-existentes (asma, anemia falciforme, artrite reumatóide, diabetes, hipertensão arterial, imunodeficiências, outras).

No exame físico, destacar a importância da aferição da pressão arterial sentada e de pé e prova do laço. Exames laboratoriais: hemograma completo, prova de função hepática e sorologia para Dengue - Controle de vetores peri-hospitalar.



Prova do Laço

Aferir PA. Manter o manguito inflado na média das pressões sistólica e diastólica por 5 minutos. Desinsuflar e retirar o manguito e procurar petéquias na área de maior concentração onde estava o manguito e abaixo da prega do cotovelo. Encontradas 20 ou mais petéquias em uma área de 1,78cm (uma moeda de 1 centavo), a prova é positiva.



SECRETARIA
DE SAÚDE
E DEFESA CIVIL



FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA
MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE - PAISMCA

Em caso de dúvidas contactar :

Dra. Christiane Alvarenga
(Hospital Estadual Azevedo Lima)

Tel: (21) 2299-9036 (21)9765-0265

Dra Maria das Graças Araújo Costa Neves
(Hospital Estadual Rocha Faria)

Tel: (21) 9988-0426

Dra Patrícia Brasil
(Fiocruz)

Tel: (21) 8869-9849

Dr Roger Rohloff
(Maternidade Fernando Magalhães)

Tel: (21) 9636-6325

Saúde da Mulher
(Secretaria de Saúde e Defesa Civil)

Rua México, 128 sala 415

Tel: 2299-9746/ 9747/ 9748

www.saude.rj.gov.br

